

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(Информация для потребителей)
Стендра (STENDRA)
(Аванафил)

Внимание! Препарат, который вы получили, является дженериком Стендры, то есть ее полным аналогом. Данная инструкция применима к Стендре и к любому ее дженерику.

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед началом приема препарата.

- Сохраните инструкцию. Возможно, вы захотите прочитать ее еще раз.
- Если вам будет что-то непонятно или у вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.

1. Общие сведения о препарате.

1.1. Торговое (патентованное) название препарата

Стендра

1.2. Международное (непатентованное) название

Аванафил

1.3. Лекарственная форма и назначение

Таблетки, покрытые оболочкой, для применения внутрь.

1.4. Состав

Активное вещество: аванафил в дозировке 50, 100 или 200 мг.

2. Показания к применению

Аванафил рекомендуется для лечения эректильной дисфункции различной степени тяжести, вызванной как психологическими, так и физиологическими причинами.

3. Противопоказания

3.1. Применение Стендры (Аванафила) запрещается:

- ✓ Женщинам и детям, не достигшим 18-ти лет;
- ✓ при приеме нитратов в любом виде и форме;

- ✓ людям, принимающим сопутствующие сильные ингибиторы СYP3A4 (в т.ч. кетоконазол, ритонавир, атазанавиром, кларитромицин, индинавир, итраконазол, нефазодон, нельфинавир, саквинавир и телитромицин);
- ✓ при повышенной чувствительности к любому из компонентов препарата;
- ✓ людям с тяжелыми формами печеночной или почечной недостаточности.

3.2. С осторожностью Стендру (аванафил) следует принимать:

- ✓ при сердечно-сосудистых заболеваниях, при которых противопоказана сексуальная активность;
- ✓ при инфаркте миокарда или инсульте, которые произошли в течение последних шести месяцев;
- ✓ при неконтролируемом изменении давления, вызванном гипертензией или гипотензией;
- ✓ при проблемах с кровотечением, язве желудка;
- ✓ при одновременном приеме умеренных ингибиторов СYP3A4 (в т.ч. эритромицин, ампренавир, апрепитант, дилтиазем, флуконазол, фосампренавир, и верапамил) максимальная суточная доза аванафила не должна превышать 50 мг.
- ✓ при анатомической деформацией полового члена (углы, болезнь Пейрони, кавернозный фиброз) или предрасположенности к приапизму (серповидно-клеточной анемии, множественной миеломе или лейкемии);
- ✓ при приеме альфа-блокаторов и других антигипертензийных препаратов. Перед началом приема Стендры необходимо проконсультироваться с лечащим врачом;
- ✓ не рекомендуется принимать Стендру совместно с другими препаратами группы ингибиторов ФДЭ-5(Виагра, Левитра, Сиалис), так как их совместное действие не изучено;

3.3. Немедленно прекратить применение препарата Стендра, и обратиться за консультацией к врачу, следует при:

- ✓ резком ухудшении качества зрения одного или обоих глаз. Это может быть признаком передней ишемической оптической невропатии.
- ✓ резком снижении или потере слуха, которое может сопровождаться шумом в ушах и головокружением.

3.4. Взаимодействие с алкоголем

Алкоголь и препараты группы ингибиторов ФДЭ-5, в том числе Стендра, расширяют кровеносные сосуды. Поэтому при незначительном употреблении алкоголя применять Стендру вполне допустимо. Но существенное употребление алкоголя (больше трех бокалов вина или 300 г. водки) в сочетании со Стендрой могут увеличивать частоту сердечных сокращений, снижение артериального давления, головокружение и головную боль.

4. Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь по мере необходимости за 30 минут до предполагаемой сексуальной близости.

Рекомендуемая начальная доза препарата Стендра составляет 100 мг.

В зависимости от индивидуальных особенностей организма дозу препарата можно сократить до 50 мг., или увеличить до максимальной дозы - 200 мг.

Рекомендуемая частота приема препарата – 1 раз в течение 24 часов.

Стендру можно принимать, не зависимо от приема пищи.

Продолжительность действия препарата составляет 4-6 часов.

Эрекция после приема препарата возникает только при сексуальном возбуждении.

5. Взаимодействие Стендры с другими лекарственными препаратами:

Не принимайте препарат Стендра если вы принимаете нитраты. Нитраты используются для лечения болей в груди (стенокардии). Прием Стендры совместно с нитратами может спровоцировать сердечный приступ или инсульт.

Обязательно проконсультируйтесь с врачом, если вы принимаете следующие препараты:

- ✓ ингибиторы ВИЧ-протеазы, такие как ритонавир(Норвир), индинавир (Криксиван), саквинавир (Инвираса) или атазанир (Реатаз);

- ✓ некоторые противогрибковые препараты: кетоконазол (Низорал), ироконазол (Споронокс);
- ✓ некоторые типы антибиотиков: кларитромицин (Biaxin), Телитромицин (Ketek) или эритромицин;
- ✓ альфа-блокаторы: Hytrin (теразолином), Flomax (тамсулозина HCl), Cardura (Доксазозин), Minipress (празозин HCl), Uroxatral (альфузозин HCl), Jalyn (алопеции и тамсулозин HCl), либо RAPAFL0 (силодозин);
- ✓ некоторые лекарства для лечения высокого кровяного давления;
- ✓ другие препараты для лечения эректильной дисфункции.

6. Побочные эффекты при применении препарата

При приеме Стендры наиболее часто наблюдались головная боль, насморк, боль в горле, боли в спине.

7. Условия хранения

Храните таблетки при температуре 20-25° С в темном, недоступном для детей месте.

8. Срок годности

Дата изготовления и срок годности отпечатан заводским способом на блистере препарата.

9. Условия отпуска из аптек

Препарат отпускается по рецепту врача.